



8. ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

18-20 Ekim 2024

Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



PROGRAM VE ÖZET KİTABI



www.2024cocukgogus.org



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SS-18

TÜRKİYE'DE ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA METABOLİK NEDENLERİN SIKLIĞI, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSAL KAYIT SİSTEMİ VERİLERİNİN ANALİZİ

Merve Selçuk Balcı¹, Fazılcan Zirek², Handan Kekeç³, Melih Hangü⁴, Gökçen Kartal Öztürk⁵, Burcu Çapraz Yavuz⁶, Gülay Bilgin⁷, Beste Özsezen⁸, Ayşen Bingöl⁹, Mina Gharibzadeh Hızal¹⁰, Azer Kılıç Başkan¹¹, Ali Özdemir¹², Tuğba Ramaslı Gürsoy¹³, Nazan Çobanoğlu², Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu³, Nagehan Emiralioğlu⁶, Ahmet Cevdet Ceylan¹⁴, Berna Oğuz¹⁵, Diclehan Orhan¹⁶, Ayşe Ayzıt Kılınç¹¹, Saniye Girit⁷, Sevgi Pekcan¹⁷, Güzin Cinel¹⁸, Ebru Yalçın⁶, Nural Kiper⁶, Yasemin Gökdemir¹

¹Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

³Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁴Cengiz Gökçek Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁵Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁶Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁷İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁸Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁹Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹⁰Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹¹Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹²Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹³Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹⁴Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

¹⁵Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

¹⁶Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı

¹⁷Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹⁸Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada Türkiye Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (chILD) kayıt sistemindeki veriler incelenerek, metabolik nedenlerin sıklığı, klinik ve laboratuvar özellikleri ile uygulanan tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ağustos 2024'e kadar kayıt sistemine dahil edilen, metabolik hastalık tanısı konmuş çocuk hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.

SONUÇLAR: Çalışmaya 31 hasta dahil edilmiştir, tüm olgular içinde sıklık % 4,2 olarak belirlenmiştir. Hastaların %58,1'i (n=18) erkek olup, ortalama yaş 8,0 (5,2-15,2) yıldır (Tablo 1). En sık ILD'ye neden olan sınıf lizozomal depo hastalıklarıydı (LDH) (n=24, %77,4) en sık alt tip Nieman Pick'ti (n=15, %48,3) (Tablo 2). Sitokrom- c oksidaz eksikliği tanısı olan bir hasta solunum yetmezliği tanısı ile yaşamını yitirmişti. Solunum bulgularının başlama yaşı 2,4 (0,6-6,8)' yıl idi. En sık başvuru şikayeti öksürüktü (%48,3, n=15). 27 hastaya akciğer bilgisayarlı tomografisi çekildi, en sık patolojik bulgu interseptal kalınlaşmalardı (%66, 6, n=18). Sekiz hastaya tanısız flexible bronkoskopi (FOB) yapılmıştı. LDH bulunan 4 hastada lipid yüklü makrofajlar tespit edilmişti (Tablo 1). Tedavide, bir Gaucher hastasına akut alevlenme döneminde pulse steroid tedavisi uygulanmış, 4 hasta inhale kortikosteroid ve 4 hasta enzim replasman tedavisi (ERT) almıştı. İki hasta sürekli oksijen, 2 hasta noninvaziv mekanik ventilasyon ve 3 hasta invaziv mekanik ventilasyon desteği alıyordu. ERT alan hastaların hiçbirisi solunum desteği almamıştı.



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ

18-20 Ekim 2024
Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SONUÇ: Metabolik hastalıklar sık akciğer enfeksiyonundan ILD' ye kadar geniş bir yelpazede solunum sistemi tutulumu yapabilmektedir. Çoğunlukla semptom ve bulgular nonspesifik olsa da LDH'lerde bronkoskopik incelemeler ile spesifik depo hücrelerinin görülmesi tanıya yardımcıdır. ERT, metabolik hastalık ilişkili akciğer tutulumunu azaltarak mortalite ve morbiditeyi azaltmada etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: metabolik hastalıklar, intertisyel akciğer hastalığı, Nieman Pick, çocuk, Lizozomal depo hastalıkları

Tablo 1: Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları

Hasta sayısı	31 (% 100)
Ölüm, n (%)	1 (% 3,2)
Cinsiyet, erkek, n (%)	18 (58,1)
Yaş, ortanca (25.-75. persantil)	8,0 (5,2-15,2)
Şikayet başlama yaşı, ortanca (25.-75. persantil)	2,4 (0,6-6,8)
En sık solunum sistemi şikayeti, öksürük	15 (%48,3)
Özgeçmiş	
Yenidoğan yoğun bakım yatış öyküsü, n(%)	5 (%16,1)
Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsü, n(%)	11 (%35,5)
Tekrarlayan kulak enfeksiyonu, n(%)	1 (% 3,2)
Aspirasyon pnömonisi öyküsü, n(%)	3 (% 9,7)
Fizik muayene bulguları, n (%)	
Ağırlık, z skoru, ortalama ($\pm$ SS)	-1,8 ($\pm$ 1,5)
Boy, z skoru, ortalama ($\pm$ SS)	-3,5 ($\pm$ 2,2)
Çomak parmak	2 (% 6,5)
Göğüs duvarı anomalisi, Pektus carinatum	6 (%19,4)
En sık bronkoskopi bulgusu, n=8	
Makroskopik bulgu	Normal, n= 4 (%50)
Bronkoalveoler lavaj, kültür	Normal, n= 4 (%50)
Bronkoalveoler lavaj, sitoloji	Lipid yüklü makrofaj, n= 4 (% 50)
Akciğer bilgisayarlı tomografi bulgusu (en sık), n=27	İnterseptal kalınlaşma, n=18 (%66, 6)
Pulmoner hipertansiyon, n (%)	1 (% 3,2)
Solunum destek tedavisi, n (%)	
Oksijen	2 (% 6,5)
Noninvaziv mekanik ventilasyon	2 (% 6,5)
İnvaziv mekanik ventilasyon	3 (9,7)
Solunum sistemine yönelik diğer tedaviler, n (%)	
Pulse steroid	1 (% 3,2)
İnhale steroid	4 (% 12,9)
Enzim replasman tedavisi, n (%)	4 (% 12,9)

Tablo 1: Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



Tablo 2

Tablo 2 : Ulusal Türkiye ILD Kayıt Listesinde Yer Alan Metabolik Hastalıkların Tanı Sıklıkları, Yaş Dağılımı ve Şikayet Başlangıç Yaşı

Tanı	Hasta sayısı, n (%)	Yaş, yıl Ortanca, (min.-max)	Şikayet başlangıç yaşı, yıl Ortanca, (min.-max)
Lizozomal Depo Hastalıkları	24 (% 77,4)	8,5 (5,8-14,3)	2,8 (1,0-6,9)
Nieman Pick	15 (% 48,3)	8,0 (3,2-16,6)	2,2 (0,1-10,0)
Tip A	1 (% 3,2)	16,6	0,5
Tip B	5 (% 16,1)	7,0 (3,2-15,5)	4,4 (0,2-10,0)
Tip A/B	5 (% 16,1)	8,0 (3,6-16,0)	2,0 (1,0-5,8)
Tip C	4 (% 12,9)	8,3 (3,2-15,5)	3,9 (0,1-8,1)
Gaucher Hastalığı	7 (% 22,6)	10,0 (5,0-16,0)	5,4 (0,5-14,2)
Tip 1	3 (% 9,7)	15,2 (10,0-16,0)	7,2 (2,4-14,2)
Tip 3	3 (% 9,7)	5,8 (5,1-10,7)	5,4 (0,5-8,2)
Sınıflanmamış	1 (% 3,2)	5	1,3*
Mukopolisakkaridoz Tip 6	1 (% 3,2)	6,7	3,0
Fukosidoz	1 (% 3,2)	11,8	3,5
Multiple Sulfataz Eksikliği	1 (% 3,2)	6*	0,6*
Aminoasit Metabolizması Bozukluğu	4 (% 12,9)	14,1 (3,0-16,3)	1,9 (0,5-14,1)
Lizinürik Protein İntoleransı	2 (% 6,5)	14,1 (12,1-16,3)	1,8 (0,6-3,1)
Pirolidaz Eksikliği	2 (% 6,5)	9,5 (3,0-16,0)	7,2 (0,5-14,1)
Vitamin Metabolizması Bozukluğu	1 (% 3,2)	4	0,1
Biyotinidaz Eksikliği			
Mitokondriyal Hastalık	1 (% 3,2)	3,2	0,1
Sitokrom C Eksikliği			

Not: * Hasta sayısı bir olan gruplarda ortanca ve ortalama değer hesaplanmamıştır.

Ulusal Türkiye ILD Kayıt Listesinde Yer Alan Metabolik Hastalıkların Tanı Sıklıkları, Yaş Dağılımı ve Şikayet Başlangıç Yaşı



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SS-19

TÜRKİYE CHILD KAYIT SİSTEMİ'NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI DİFFÜZ ALVEOLAR HEMORAJİ HASTALARININ TANILARI KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE PROGRESLERİ

Atacan Ögütçü¹, Gökçen Kartal Öztürk¹, Figen Gülen¹, Dilber Ademhan Tural², Uğur Özçelik³, Ela Erdem Eralp⁴, Erkan Çakır⁵, Fazılcan Zirek⁶, Erdem Başaran⁷, Handan Kekeç⁸, Mehmet Köse⁹, Yasemin Mocan Çağlar¹⁰, Gizem Özcan¹¹, Gökçen Ünal¹², Çiğdem Korkmaz¹³, Gökçen Dilşa Tuğcu², Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu⁸, Ayşe Ayzıt Kılınç¹³, Güzin Cineş¹, Nazan Çobanoğlu⁶, Saniye Girit¹⁰, Nagehan Emiralioğlu³, Ebru Güneş Yalçın³, Sevgi Pekcan¹², Yasemin Gökdemir⁴, Diclehan Orhan¹⁴, Berna Oğuz¹⁵, Nural Kiper³

¹Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

²Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

³Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁴Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

⁵İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

⁶Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁷Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Antalya

⁸Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁹Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri

¹⁰İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

¹¹Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri

¹²Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Konya

¹³İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

¹⁴Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Patoloji Bilim Dalı, Ankara

¹⁵Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Diffüz alveolar hemoraji (DAH), hemoptizi ve öksürük ile kendini gösteren alveoller içerisinde kan birikimi ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Etiyolojisinde immün ve non-immün nedenler sorumludur. Bu çalışmada, ülkemizde chILD tanısı ile takipli DAH hastalarının tanıları, akciğer bulguları ve klinik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

METOD: 2023 yılında Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Türkiye Kayıt Sistemi'nde (chILD-TR) kayıtlı diffüz alveolar hemoraji olan hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, başvuru yaşı, tanı yaşı), klinik ve laboratuvar bulguları, radyolojik görüntüleri, tanıları ve tedavileri incelenmiştir.

SONUÇLAR: chILD-TR sisteminde diffüz alveolar hemoraji nedeniyle takip edilen 32 (%4,8) hasta kayıtlıydı, 19'u erkekti, ortalama güncel yaşları 15±6,5 yıldır. Şikayetlerin başlama yaşı ortalama 9,1±6,4 yaştı. Yapılan tetkikler sonucunda 16 (%50) hasta İdiyopatik pulmoner hemosideroz (IPH), 4 (%12,5) hasta Wegener granülomatozis, 4 (%12,5) hasta idiyopatik veya enfeksiyon ilişkili, 2 (%6,25) hasta Behçet hastalığı, 1'er (%3,12) hasta Goodpasture hastalığı, vaskülitte bağlı yaygın alveolar kanama, mesleki akciğer hastalıkları ve pnömokonyozlar, toksik inhalasyon, pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı DAH tanısı almıştı. Tedavide en sık kullanılan ilaçların; oral steroid 22 (%68) hasta, pulse steroid 9 (%28) hasta, azatiyopürin 6 (%19) hasta ve hidroklorokin 5 (%15) hasta olduğu görüldü. Hastaların 22'sinin mevcut tedavisi devam etmekteydi. İzlemde 5 (%15) hastada eksaserbasyon gelişmişti.

TARTIŞMA: Çocukluk çağında DAH nedeniyle takipli hastalar, chILD grubu içerisinde oranı düşük ancak oldukça geniş etiyolojiye sahiptir. Hastaların tanısının kesinleşmesi ve tedavi süreçlerinde, klinik seyri farklılık göstermektedir. Kayıt sistemimizdeki DAH nedeniyle takipli bu ilk hasta verilerinin, ilerleyen zamanda hasta sayısının artmasıyla daha da genişleyeceğini düşünmekteyiz.



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ

18-20 Ekim 2024
Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



Anahtar Kelimeler: Çocuk, Diffüz alveoler hemoraji, Hemoptizi, interstisyel akciğer hastalığı, İdiyopatik pulmoner hemosideroz

TABLO: Tanı ve tedavi

TANI	Oral Steroid	Pulse Steroid	Inhale Ste.	Hidro ksiklo rokin	Siklo Fosfa mid	M M F	Azaltıy opürin	Azıt Ro misin	I V I G	Diğer	Tdv. Dev. m?
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓										
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓		✓	✓				✓			✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓						✓				✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓	✓					✓				✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓										
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓			✓			✓				✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓	✓									✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓										✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓										
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓			✓							✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓	✓									✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz		✓									✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz											
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓		✓								✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz	✓		✓	✓				✓		✓	✓
İdiyopatik pulmoner hemosideroz											
Wegener granülomatosis	✓										✓
Wegener granülomatosis		✓									
Wegener granülomatosis	✓						✓				✓
Wegener granülomatosis		✓									
Akciğer kan., idiyopatik/enfeksiyona bağlı											✓
Akciğer kan., idiyopatik/enfeksiyona bağlı	✓		✓								✓
Akciğer kan., idiyopatik/enfeksiyona bağlı	✓										
Akciğer kan., idiyopatik/enfeksiyona bağlı											
Behçet hastalığı	✓				✓		✓			✓	✓
Behçet hastalığı	✓				✓		✓				✓
Goodpasture hastalığı		✓			✓	✓					✓
Vaskülitte bağlı yaygın alveoler kanama	✓	✓		✓		✓					✓
Mesleki akciğer hastalıkları / pnömokonyozlar											
Toksik inh., oblit. bronşiolit ile birlikte/yok	✓	✓							✓	✓	✓
Akciğer hipertansiyonu, primer veya sekonder										✓	✓
Kalp fonk. boz. bağlı konjestif değişiklikler	✓										✓
Toplam 32 hasta	22	9	4	5	3	2	6	2	1	4	22



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SS-21

BEBEKLİK DÖNEMİ NÖROENDOKRİN HÜCRE HİPERPLAZİSİ: ULUSAL KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI, TÜRKİYE

Gökçen Ünal¹, Hanife Tuğçe Çağlar², Fatih Ercan², Sevgi Pekcan², Ayşe Tana Aslan³, Tugba Sismanlar Eyuboglu³, Fazılcan Zirek⁴, Nazan Çobanoğlu⁴, Deniz Dogru⁵, Ebru Yalçın⁵, Nagehan Emiralioglu⁵, Nural Kiper⁵, Berna Oğuz⁵, Diclehan Orhan⁵, Ahmet Cevdet Ceylan¹², Ela Erdem Eralp⁶, Yasemin Gokdemir⁶, Sanem Eryılmaz Polat⁷, Güzin Cinel⁷, Mehmet Köse⁸, Halime Nayır Büyüksahin⁹, Ayşe Ayzit Kiliç¹⁰, Saniye Girit¹¹

¹Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

²Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

³Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁴Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁵Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁶Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Biliyom Dalı

⁷Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁸Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

⁹Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹⁰İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹¹İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹²Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları (chILD) nadir görülen, heterojen ve diffüz akciğer hastalıklarıdır. Alveoler epitel ve mezenkimal anormal aktivasyon hastalığın temel patogenezi oluşturur. Bebeklik çağındaki nöroendokrin hücre hiperplazisi (NEHI) ise nadir görülen bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Bebeklik döneminde tipik olarak hipoksemi, takipne ve solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar. Çalışmamızda Türkiye Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi'ne göre, NEHI tanısı alan hastaları değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: 2015-2024 yılları arasında NEHI tanısı alıp Türkiye Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi'ne kaydedilen 14 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Tanı yaşları, laboratuvar bulguları, solunum fonksiyon testleri, serolojik ve radyolojik bulguları, genetik değerlendirmeleri, bronkoalveoler lavaj ve akciğer biyopsi incelemeleri ile tedavide kullanılan ilaçların ve hastalığın uzun dönem prognozu hakkındaki bilgileri incelendi.

SONUÇLAR: Türkiye Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi'ne kaydedilen 687 hastanın 14'ü (%2'si) NEHI tanısı ile takip edilmektedir. 14 hastanın dokuzu (% 64,2) erkek, beşi (% 35,8) kızdı. Tanı alma yaş ortalaması 15,8 ay idi. Üçü birinci derece kuzen olmak üzere toplam beş hastamızın anne ve babası arasında akrabalık vardı. Tüm hastalar tomografi sonuçlarına göre tanı almıştır. Tablo 1'de başvuru şikayetleri, Tablo 2'de tomografi bulguları ve Tablo 3'te vücut ağırlığı ve boy SDS'leri, bronkioskopi ve genetik sonuçları sunulmuştur.

TARTIŞMA: Bebeklik döneminde NEHI tanısı alan hastaların uzun dönem prognozunu bildiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Birinci basamakta ve akut bakım ortamlarında nispeten yeni ve nadir görülen bu hastalık hakkında farkındalık eksikliği, tanının gecikmesine ve gereksiz antibiyotik kullanımına yol açmaktadır. Çalışmamız NEHI tanısı koymanın zorluklarına ve önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: diffüz akciğer hastalığı, infant, takipne



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ

18-20 Ekim 2024
Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



Başvuru şikayetleri ve oksijen saturasyon değerleri (SpO₂)

Hasta No	Öksürük	Dispne	Takipne	Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu	Ateş	Hırıltı	Morarma	Beslenme Bozukluğu	SP02
1	+	-	+	-	-	-	-	-	90
2	-	-	+	+	-	-	-	-	78
3	-	-	+	+	-	-	-	-	95
4	-	-	+	-	-	-	-	+	97
5	-	+	+	-	-	-	-	-	84
6	-	-	+	-	-	-	-	-	92
7	+	+	-	+	-	-	+	+	80
8	+	-	-	+	-	+	-	-	98
9	-	-	+	-	-	-	-	-	98
10	-	+	+	+	-	-	-	+	88
11	+	+	+	-	-	-	-	-	90
12	+	-	+	-	-	-	+	-	83
13	+	-	+	-	-	-	-	-	92
14	+	-	+	-	-	-	-	-	96

Tomografi Bulguları

Hasta No:	Linear veya retiküler opasite	Nodul ya da noduler opasite	Buzlu cam opasitesi	Fokal konsolidasyon	Kistik lezyonlar	Balpeteği görünümü	Amfizem	Mozaik Perfüzyon	Havalandırma Artışı
1	+	+	+	+	-	-	-	-	+
2	-	-	+	+	-	-	-	-	-
3	-	-	+	-	-	-	-	-	-
4	-	-	+	-	-	-	-	-	-
5	-	-	+	-	-	-	-	-	+
6	-	-	+	-	-	-	-	-	-
7	+	+	+	+	-	-	-	+	+
8	-	-	+	-	-	-	-	-	-
9	-	-	+	-	-	-	-	-	-
10	-	-	+	-	-	-	-	+	-
11	-	-	+	-	+	-	-	-	-
12	-	-	+	-	-	-	+	+	+
13	-	-	+	+	-	-	-	+	+
14	-	-	+	-	-	-	-	-	-



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ

18-20 Ekim 2024
Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



Vücut ağırlığı ve boy SDS değerleri, bronkoscopi ve genetik sonuçları

Hasta No	Tanıda Vücut ağırlığı (SDS)	Tanıda boy (SDS)	1.yıl sonunda vücut ağırlığı (SDS)	2.yıl sonunda boy (SDS)	Bronkoscopi	Genetik
1	+1,01	+1,36	-0,62	+0,56	Nonspesifik Bal yaymaları	-
2	-2,25	+1,48	-1,23	-0,1	Minimal lenfositik inflamasyon, CMV PCR:- 3170kopya/L	Sanger Analizi: TTF-1, FOXP1 negatif
3	-0,7	+0,8	-0,3	+0,6	-	-
4	-2,44	-1,94	-2,25	-0,37	-	Sanger Analizi: Normal
5	-1,77	-1,34	+0,6	+0,52	Normal, PAS boyama negatif	Tüm ekzon analizi: Normal
6	-2,24	-0,7	-0,91	-0,12	-	ABCA3, SFTPB ve SFTPC, CSF2RB, CFS-2RA negatif
7	-1,68	-1,85	+0,33	-0,11	-	-
8	-0,81	-0,5	-1,58	-1,49	Normal	-
9	+0,15	-0,42	+0,63	+0,42	Normal	-
10	-0,51	+1,18	-0,51	+0,18	-	Tüm ekzon analizi: Normal
11	-1,52	-0,48	-1,22	+1,75	Normal	Sürfaktan paneli: Normal
12	-1,31	+0,54	-1,61	-0,96	-	-
13	-0,52	-0,1	-0,4	-0,1	-	-
14	-0,82	-0,2	-0,9	-1,01	-	NKX-1, SFTPC: Normal



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SS-22

ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ BULGULARININ TANIDA ÖNEMİ VE RADYOLOJİK BULGULAR İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE CHILD ULUSAL KAYIT SİSTEMİ, KOHORT ÇALIŞMASI

Aslı İmran Yılmaz¹, Sevgi Pekcan², Nagehan Emirlioğlu³, Ebru Yalçın³, Nural Kiper³, Ayşe Ayzıt Kılınç⁴, Saniye Girit⁵, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu⁶, Güzin Cinel⁷, Yasemin Gökdemir⁸, Berna Oğuz⁹, Nazan Çobanoğlu¹⁰, Dicle Orhan¹¹, Ela Erdem Eralp⁸, Almula Pınar Ergenekon⁸, Havva İpek Demir³, Raziye Atan³, Fazılcan Zirek¹⁰, Merve Nur Tekin¹⁰, Ayşe Tana Aslan⁶, Handan Kekeç⁶, Deniz Mavi Tortop⁵, Yasemin Mocan Çağlar⁵, Özge Ülgen⁵, Abdurrahman Erdem Başaran¹², Azer Kılıç Başkan⁴, Çiğdem Korkmaz⁴, Berrak Öztosun⁴

¹Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları

³Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

⁴İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

⁵İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

⁶Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

⁷Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği,

⁸Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

⁹Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Anabilim Dalı,

¹⁰Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

¹¹Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

¹²Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı,

GİRİŞ: İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH)'da bronkoskopi hücre sayımlarının analizi, alveolar düzeyde meydana gelen immünolojik, inflamatuvar, neoplastik ve enfeksiyöz süreçlere ilişkin bilgiler sağlar. Bilgisayarlı tomografi (Bt), İAH'yi karakterize etmek için altın standarttır. Bu çalışmanın amacı, Ulusal Kayıt Sistemi'nde bulunan İAH hastalarının Bronkoalveolar lavaj (Bal) bulgularının tanıda önemi ve radyolojik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.

MATERYAL-METOD: 2022-2023 yılı Ulusal Kayıt Sistemi'nde bulunan hastaların verileri retrospektif incelenmiştir. Hastalık alt grupları, tanı yaşları, klinik, laboratuvar bulguları, serolojik, radyolojik bulguları ve Bal bulguları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Toplam kayıtlı 599 hastadan bronkoskopi yapılan ve Toraks Bt'si olan hasta 255 idi. Erkek/kız:130/125. Hastaların ortalama tanı yaşı 6,49±4,6 ay, hastalarda en sık görülen klinik bulgu 165 (%74.3) öksürük idi. Hastalık tanıları alt kategorilere ayrıldığında en sık 70 (%27.4) B2 (bağışıklığı sağlam olduğu varsayılan konakta İAH), en sık Bt bulgusu buzlu cam opasitesi 151 (%61.4) idi. BAL bulgularında %42.1'de nötrofil, %15.8 eozinofil ve %25.5'inde lenfosit hakimiyeti saptanmıştır. Hastalar 6 (%2.4) PAS + olması ile pulmoner alveolar proteinozis (%83'ü sürfaktan protein eksikliği), 5 (%2.0) hemosiderin yüklü makrofaj ile pulmoner hemosiderozis, 3(15.8%) eozinofil hakimiyeti ile hipereozinofilik sendrom, Cd1a+ olan 4(%1.8) LHH tanısı almıştır. Hastalar Bal bulguları ve radyolojik bulguları arasındaki ilişki açısından değerlendirildiğinde interseptal kalınlaşma ve mediastinal lenfadenopati ile yüksek hemosiderin yüklü makrofaj düzeyi arasında anlamlı ilişki görüldü(p<0,05). İnterseptal kalınlaşma ile PAS + hastalarda ve fokal konsolidasyonlar ile nötrofil hakimiyeti olan hastalarda anlamlı ilişki görüldü (p=0,02, p=0,04).

SONUÇ: Bal'ın sitolojik değerlendirmesi, Toraks Bt ile kullanıldığında, İAH'da tanısız değerlendirme için yararlı bilgiler sağlayabilir ve cerrahi akciğer biyopsisi gibi invazif prosedür ihtiyacını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi, bronkoalveolar lavaj, interstisyel akciğer hastalığı



ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 8. KONGRESİ 18-20 Ekim 2024 Wyndham Garden Otel, Diyarbakır



SS-23

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SİSTEMİK HASTALIKLARA BAĞLI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI: TÜRKİYE CHILD ULUSAL KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ

Çiğdem Korkmaz¹, Berrak Öztosun¹, Azer Kılıç Başkan¹, Fazılcan Zirek², Gülay Bilgin³, Meltem Akgül Erda⁴, Fatma Nur Ayman⁵, Handan Kekeç⁶, Sanem Eryılmaz Polat⁷, Beste Özsezen¹¹, Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı¹, Yasemin Gökdemir¹⁰, Güzin Cinel⁷, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu⁶, Sevgi Pekcan⁵, Berna Oğuz⁸, Diclehan Orhan⁹, Nagehan Emirlioğlu Ordukaya⁴, Elmas Ebru Yalçın⁴, Nazan Çobanoğlu², Saniye Girit³, Emine Nural Kiper⁴

¹IUC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

³İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

⁴Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁵Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Konya

⁶Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁷Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

⁸Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

⁹Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

¹⁰Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

¹¹Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (chILD), çocuklarda nadir görülen, yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip, geniş ve heterojen bir hastalık grubudur. Bu hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve depo hastalıkları gibi çeşitli sistemik hastalık süreçlerine bağlı olarak gelişebilir. Bu çalışma, Türkiye chILD.

Kayıt Sistemiindeki hastalarda, sistemik hastalıklara bağlı ILD olgularını incelemeyi amaçlamaktadır. 2022-2023 yıllarında Türkiye chILD Kayıt Sistemi'ne B-1 Tanı Kodu (Sistemik Hastalıklara Bağlı Olarak Gelişen Diffüz Parankimal Akciğer Hastalığı) ile kayıtlı 27 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Bu hastaların demografik bilgileri, klinik, laboratuvar, radyoloji, bronkoskopi, patoloji bulguları, genetik analizler, uygulanan tedaviler istatistiksel açıdan analiz edilmiştir.

27 hastanın %59,2'si kız, ortalama şikayet başlangıç yaşı 6 yaş 6 ay idi. En sık görülen başvuru semptomları öksürük (%40,7, 11 hasta), hızlı nefes alma (%29,6, 8 hasta) ve dispne (%25,9, 7 hasta) olmuştur. Radyolojik incelemelerde en sık görülen bulgular buzlu cam opasiteleri (%55,5, 15 hasta), nodüler görünüm (%48,1, 13 hasta) ve interseptal kalınlaşmaydı (%48,1, 13 hasta). Tetkik sürecinde hastaların 8'ine (%29,6) bronkoskopi, 14'üne (%51,8) genetik analiz yapılmış ve 6'sı (%22,2) akciğer biyopsisi ile tanı almıştır. Hastaların kesin tanıları değerlendirildiğinde en sık görülen alt tanı gruplarının Depo Hastalıkları ilişkili chILD (%25,9), Kollajen Vasküler Hastalıklar (%11,1) ve Sarkoidoz (%11,1) olduğu görülmüştür. Tedavi seçenekleri incelendiğinde, 18 hastaya (%66,7) oral veya pulse steroid tedavisi, 2 hastaya (%7,4) biyolojik tedavi, 12 hastaya ise (%44,4) diğer immünsupresif ajanların uygulandığı gözlenmiştir.

Sistemik hastalıklara bağlı ILD, çocuklukta nadir görülmekle birlikte, hastalığın seyrinde önemli etkiye sahiptir. Bu çalışma, bu hasta grubunda görülen ILD alt tiplerinin klinik ve radyolojik özelliklerini tanımlayarak, tedavi sürecinin yönetiminde önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: bağ dokusu hastalığı, buzlu cam opasitesi, depo hastalığı, interstisyel akciğer hastalığı, sistemik hastalık