

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 9. Kongresi

9-11 Ekim 2025

Sheraton Grand Istanbul Ataşehir



PROGRAM VE ÖZET KİTABI

2025cocukgogus.org



SS-35

TÜRKİYE'DE ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARININ GÜNCEL DURUMU: CHILD-TR'DEN 5 YILLIK VERİLER

Handan Kecec¹, Ayşe Tana Aslan¹, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu¹, Sinem Can Oksay², Yasemin Mocan Çağlar², Özge Ülgen², Fatma Nur Ayman³, Fatih Erkan³, Gökçen Üna³, Çiğdem Korkmaz⁴, Azer Kılıç Başkan⁴, Abdulhamit Çollak⁴, Uğur Özçelik⁵, Deniz Doğru⁵, Raziye Atan⁵, Figen Gülen⁶, Bahar Girgin Dindar⁶, Ece Halis⁶, Esin Gizem Olgun⁷, Fazılcan Zirek⁷, Secahatin Bayav⁷, Meltem Kürtül Çakar⁸, Sanem Eryılmaz Polat⁸, Dilber Ademhan Turhal⁸, Ayşen Bingöl⁹, Abdurrahman Erdem Başaran⁹, Betül Bankoğlu Parlak⁹

¹Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye

²Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, İstanbul, Türkiye

³Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Konya, Türkiye

⁴İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, İstanbul, Türkiye

⁵Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye

⁶Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, İzmir, Türkiye

⁷Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye

⁸Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

⁹Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD, Antalya, Türkiye

GİRİŞ: Bu çalışmada, chILD-Türkiye (chILD-TR) kayıt sistemindeki veriler kullanılarak ülkemizdeki chILD'ın güncel durumunun araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM: 01.05.2025 itibarıyla chILD-TR'ye kayıtlı tüm hastaların demografik ve klinik verileri, genetik analiz sonuçları ve chILD tanıları kaydedildi. DPLD-A ve DPLD-B grupları arasında hastaların verileri karşılaştırıldı.

BULGULAR: 711 hasta (%44,7 kadın) çalışmaya dahil edildi. Güncel yaş 135 (16-383) ay, ChILD tanı yaşı 59 (11-273) aydı. En sık semptomlar öksürük (%59,5) ve dispne (%35,4) idi. Hastaların 136'sı (%19,1) ek oksijen desteği almaktaydı. İzlemde 25 hasta (%3,5) kaybedildi. Hastaların 126'sı (%17,7) DPLD-A, 549'u (%77,2) DPLD-B ve 36'sı (%5,1) sınıflandırılmayan (NA1) gruptaydı. Cinsiyet açısından gruplar arasında fark saptanmadı ($p=0,286$). Güncel yaş ortancası DPLD-A grubunda daha küçükken, ilk semptom başlama yaşı daha erken ve tanı yaşı daha geç saptandı ($p<0,05$). DPLD-A grubunda ortalama kilo z-skoru -1,43, boy z-skoru -1,04 ve VKİ z-skoru -1 olup DPLD-B grubuna göre daha düşüktü ($p<0,05$). Akraba evliliği ve mekanik ventilatör (MV) kullanımı DPLD-A grubunda daha sıklıkla ($p<0,05$). SFT ve DLCO açısından gruplar arasında fark saptanmadı ($p>0,05$). Toraks BT bulgularının karşılaştırılmasında; buzlu cam görünümü ve pektus ekskavatum DPLD-A grubunda, nodül/nodüler opasiteler, peribronşiyal kalınlaşma, mozaik perfüzyon ve bronşektazi ise DPLD-B grubunda daha sık saptandı ($p<0,05$).

SONUÇ: DPLD-A grubundaki çocukların semptomları daha erken başlamasına rağmen tanılarının daha geç konulması bu hastalık grubuna yönelik farkındalığın artması gerektiğini düşündürmüştür. Bu grupta saptanan büyüme geriliğinin ve mekanik ventilasyon gereksiniminin fazlalığı daha ağır klinik seyir ile ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, DPLD-B'de akciğer ilişkili BT bulguları komplikasyonlar açısından uzun dönemli dikkatli izlem gerekliliğini ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler: chILD, Diffüz progresif akciğer hastalığı, DPLD-A, DPLD-B